

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το ασθενή

Archifar 500mg κόνις για ενέσιμο διάλυμα/ διάλυμα προς έγχυση

Archifar 1g κόνις για ενέσιμο διάλυμα/ διάλυμα προς έγχυση

Μεροπενέμη {Meropenem}

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματα της ασθένειάς τους είναι ίδια με τα δικά σας.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό ή το νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών. Βλέπε παράγραφο 4.

Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:

1. Τι είναι το Archifar και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησιμοποιήσετε το Archifar
3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το Archifar
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσετε το Archifar
6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

1. Τι είναι το Archifar και ποια είναι η χρήση του

Το Archifar ανήκει σε μια ομάδα αντιβιοτικών φαρμάκων που ονομάζονται καρβαπενέμες. Δρα σκοτώνοντας τα βακτήρια που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές λοιμώξεις.

- Λοίμωξη που επηρεάζει τους πνεύμονες (πνευμονία)
- Πνευμονικές και βρογχικές λοιμώξεις σε ασθενείς που υποφέρουν από κυστική ίνωση
- Επιπλεγμένες λοιμώξεις του ουροποιητικού
- Επιπλεγμένες ενδοκοιλιακές λοιμώξεις
- Λοιμώξεις κατά τη διάρκεια ή μετά τον τοκετό

- Επιπλεγμένες λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών μορίων
- Οξεία βακτηριακή λοίμωξη του εγκεφάλου (μηνιγγίτιδα).

Το Archifar μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ουδετεροπενικούς ασθενείς που έχουν πυρετό και υπάρχει υποψία ότι οφείλεται σε βακτηριακή λοίμωξη.

Το Archifar μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία βακτηριακής λοίμωξης του αίματος η οποία μπορεί να συνδεθεί με οποιαδήποτε από τις λοιμώξεις που αναφέρονται παραπάνω.

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησιμοποιήσετε το Archifar

Μη χρησιμοποιήσετε το Archifar :

- σε περίπτωση αλλεργίας στη μεροπενέμη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6).
- εάν είστε αλλεργικοί (υπερευαίσθητοι) σε άλλα αντιβιοτικά όπως οι πενικιλίνες, κεφαλοσπορίνες ή οι καρβαπενέμες διότι μπορεί να είστε αλλεργικοί και στη μεροπενέμη.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας πριν χρησιμοποιήσετε το Archifar:

- εάν έχετε προβλήματα υγείας όπως προβλήματα με το συκώτι ή τα νεφρά.
- εάν είχατε σοβαρή διάρροια μετά από λήψη άλλων αντιβιοτικών.

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με μεροπενέμη μπορεί να παρουσιάσετε θετική δοκιμασία (δοκιμασία Coombs) η οποία δείχνει την παρουσία των αντισωμάτων που μπορεί να καταστρέψουν τα ερυθρά αιμοσφαίρια. Ο γιατρός θα το συζητήσει αυτό μαζί σας.

Εάν δεν είστε σίγουροι εάν κάποιο από τα παραπάνω ισχύει για σας, απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον νοσοκόμο πριν από τη χρήση του Archifar.

Άλλα φάρμακα και Archifar

Ενημερώστε τον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.

Αυτό επειδή το Archifar μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο δράσης ορισμένων άλλων φαρμάκων. Επίσης, ορισμένα φάρμακα μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο λειτουργίας του Archifar.

Ειδικότερα ενημερώστε τον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας αν παίρνετε κάποιο από τα ακόλουθα φάρμακα:

- προβενεσίδη (χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της ουρικής αρθρίτιδας)
- βαλπροϊκό οξύ/βαλπροϊκό νάτριο/βαλπρομίδη (χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της επιληψίας). Το Archifar δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί γιατί μπορεί να μειώσει τη δραστηριότητα του βαλπροϊκού νατρίου.
- από του στόματος αντιπηκτικοί παράγοντες (για την αγωγή ή την πρόληψη θρόμβων του αίματος).

Κύηση και θηλασμός

Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε αυτό το φάρμακο. Είναι προτιμότερο να αποφύγετε τη χρήση της μεροπενέμης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ο γιατρός σας θα αποφασίσει εάν πρέπει να πάρετε μεροπενέμη.

Είναι σημαντικό να ενημερώσετε τον γιατρό σας εάν θηλάζετε ή έχετε σκοπό να θηλάσετε πριν λάβετε μεροπενέμη. Μικρές ποσότητες αυτού του φαρμάκου περνούν στο μητρικό γάλα. Ως εκ τούτου, ο γιατρός σας θα αποφασίσει εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε μεροπενέμη ενώ θηλάζετε.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων

Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες σχετικά με την επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων.

Το Archifar περιέχει νάτριο.

Archifar 500 mg: Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει περίπου 2.0 mEq (45.05mg) νατρίου ανά δόση 500 mg, το οποίο πρέπει να λαμβάνετε υπ' όψιν από ασθενείς που βρίσκονται σε δίαιτα χαμηλού νατρίου.

Archifar 1 g: Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει περίπου 4.0 mEq (90.1mg) νατρίου ανά δόση 1.0 g, το οποίο πρέπει να λαμβάνετε υπ' όψιν από ασθενείς που βρίσκονται σε δίαιτα χαμηλού νατρίου.

Αν έχετε κάποια διαταραχή που απαιτεί έλεγχο της πρόσληψης νατρίου παρακαλείστε να ενημερώσετε τον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας.

3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το Archifar

Πάντοτε να χρησιμοποιείτε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας.

Το Archifar θα χορηγηθεί ως ένεση σε μεγάλη φλέβα (ενδοφλεβίως), συνήθως από το γιατρό ή το νοσηλευτικό προσωπικό.

Η διάρκεια της ένεσης μπορεί να είναι 5 λεπτά ή ανάμεσα στα 15 και 30 λεπτά. Ο γιατρός θα αποφασίσει το χρονικό διάστημα στο οποίο θα χορηγηθεί το Archifar.

Πρέπει να σας χορηγείται το φάρμακο την ίδια ώρα κάθε μέρα.

Ενήλικες

- Η δόση εξαρτάται από το είδος της λοίμωξης που έχετε, το που βρίσκεται η λοίμωξη στον οργανισμό και πόσο σοβαρή είναι. Ο γιατρός σας θα αποφασίσει τη δόση που χρειάζεται.
- Η δόση για τους ενήλικες είναι συνήθως μεταξύ 500mg και 2g. Συνήθως λαμβάνεται μια δόση κάθε οκτώ ώρες. Ωστόσο μπορεί να λάβετε μία δόση λιγότερο συχνά αν έχετε προβλήματα με τα νεφρά σας.

Παιδιά και εφήβους

- Η δόση για παιδιά μεγαλύτερα των 3 μηνών μέχρι και 12 ετών καθορίζεται σύμφωνα με την ηλικία και το βάρος του παιδιού. Η συνήθης δόση είναι μεταξύ 10 mg και 40 mg μεροπενέμης για κάθε kg βάρους. Η συγκεκριμένη δόση χορηγείται κάθε 8 ώρες. Σε παιδιά με βάρος μεγαλύτερο από 50 kg χορηγείται η δόση ενηλίκων.

Πως θα σας χορηγηθεί το Archifar

- Το Archifar θα σας δοθεί σαν ένεση ή έγχυση σε μεγάλη φλέβα.
- Ο γιατρός ή ο νοσοκόμος θα σας χορηγήσουν το Archifar.

- Παρόλα αυτά, μερικοί ασθενείς, γονείς και φροντιστές ασθενών είναι εκπαιδευμένοι να χορηγούν το Archifar στο σπίτι. Οδηγίες για να γίνει αυτό περιλαμβάνονται σε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης (στην παράγραφο με τίτλο «Οδηγίες για χρήση του Archifar από τον ίδιο τον ασθενή ή από κάποιον άλλο στο σπίτι»). Πάντα να χρησιμοποιείτε το Archifar ακριβώς όπως σας έχει πει ο γιατρός σας. Αν δεν είστε σίγουροι πρέπει να απευθυνθείτε στο γιατρό σας.
- Η ένεση σας δεν πρέπει να αναμιγνύεται ή να προστίθεται σε διαλύματα που περιέχουν άλλα φάρμακα.
- Η ένεση μπορεί να διαρκέσει περίπου 5 λεπτά ή μεταξύ 15 και 30 λεπτά. Ο γιατρός σας θα σας ενημερώσει πως θα χορηγήσετε το Archifar.
- Κανονικά οι ενέσεις σας πρέπει να γίνονται την ίδια ώρα κάθε ημέρα.

Εάν χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη δόση Archifar από την κανονική

Εάν κατά λάθος χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη δόση από αυτή που σας έχουν συνταγογραφήσει, επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας ή το πλησιέστερο νοσοκομείο.

Εάν ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε το Archifar

Εάν παραλείψετε μία δόση, θα πρέπει να σας χορηγηθεί το συντομότερο δυνατό. Εάν πλησιάζει η ώρα για την επόμενη δόση τότε παραλείψτε αυτή που χάσατε.

Μην πάρετε διπλή δόση (δύο ενέσεις συγχρόνως) για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.

Εάν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το Archifar

Μην σταματήσετε να λαμβάνετε το Archifar μέχρι να σας το πει ο γιατρός σας.

Εάν έχετε περαιτέρω απορίες σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου ρωτήστε τον γιατρό ή τον νοσοκόμο σας.

4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

Σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις

Αν εκδηλώσετε σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις, **σταματήστε να παίρνετε μεροπενέμη και απευθυνθείτε άμεσα σε γιατρό**. Μπορεί να χρειαστείτε επείγουσα ιατρική θεραπεία. Τα σημεία μπορεί να περιλαμβάνουν ξαφνική εκδήλωση:

- σοβαρού εξανθήματος, φαγούρας ή κνησμού στο δέρμα.

- οίδημα (πρήξιμο) στο πρόσωπο, στα χείλη, στη γλώσσα ή σε άλλα μέρη του σώματος.
- δύσπνοια, συριγμού (σφύριγμα) ή δυσκολία στην αναπνοή.

Βλάβη στα ερυθροκύτταρα (μη γνωστή συχνότητα- η συχνότητα δε μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα)

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

- μη αναμενόμενη δύσπνοια.
- κόκκινα ή καφέ ούρα.

Αν παρατηρήσετε οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες, **απευθυνθείτε αμέσως στον γιατρό.**

Άλλες πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες:

Συχνές (μπορεί να επηρεάζουν έως 1 στους 10 ασθενείς)

- πόνος στο στομάχι
- αίσθημα ναυτίας (ναυτία)
- αδιαθεσία (έμετος).
- διάρροια.
- πονοκέφαλος.
- δερματικό εξάνθημα, φαγούρα στο δέρμα.
- πόνος και φλεγμονή.
- αυξημένος αριθμός αιμοπεταλίων στο αίμα (φαίνεται σε έλεγχο αίματος).
- αλλαγές σε αποτελέσματα αναλύσεων αίματος, περιλαμβανομένων ελέγχων για την λειτουργία του ήπαρ σας.

Όχι συχνές (μπορεί να επηρεάζουν έως 1 στους 100 ασθενείς)

- αλλαγές στο αίμα - μειωμένος αριθμός αιμοπεταλίων (πιο εύκολος μωλωπισμός), αυξημένος αριθμό μερικών λευκών αιμοσφαιρίων, μειωμένος αριθμό άλλων λευκών αιμοσφαιρίων και αυξημένη ποσότητα μίας ουσίας που ονομάζεται «χολερυθρίνη». Ο γιατρός σας μπορεί να κάνει κάποιες αιματολογικές εξετάσεις ανά διαστήματα.
- αλλαγές σε αποτελέσματα αιματολογικών αναλύσεων, συμπεριλαμβανομένων εξετάσεων για τον έλεγχο της λειτουργίας των νεφρών σας.
- αίσθημα αιμοδίας, μυρμηκιάσεις
- λοιμώξεις του στόματος (μυκητώδης στοματίτιδα) ή του κόλπου που οφείλονται σε μύκητες (άφθα).

Σπάνιες (μπορεί να επηρεάζουν έως 1 στους 1000 ασθενείς)

- κρίσεις (σπασμοί).

Άλλες πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες (άγνωστης συχνότητας-η συχνότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα)

- φλεγμονή εντέρου με διάρροια.
- πόνος/σκληρότητα φλέβας στο σημείο της ένεσης.
- άλλες μεταβολές στο αίμα. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν συχνές λοιμώξεις, πυρετό και πονόλαιμο. Ο γιατρός μπορεί να ζητήσει να υποβληθείτε σε αιματολογικές εξετάσεις ανά διαστήματα.
- ξαφνική εκδήλωση σοβαρού εξανθήματος ή φλυκταινών (φουσκάλες) ή ξεφλούδισμα του δέρματος. Αυτό μπορεί να συσχετίζεται με ψηλό πυρετό και πόνο στις αρθρώσεις.
- Σοβαρές αντιδράσεις υπερευαισθησίας που περιλαμβάνουν πυρετό, δερματικό εξάνθημα και μεταβολές στις εξετάσεις αίματος που ελέγχουν τη λειτουργία του ήπατος (αυξημένα επίπεδα ηπατικών ενζύμων) και μία αύξηση σε ένα τύπο των λευκοκυττάρων (ηωσινοφιλία) και διογκωμένους λεμφαδένες. Μπορεί να υπάρχουν σημεία πολυοργανικής διαταραχής ευαισθησίας γνωστής ως σύνδρομο DRESS.

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475, www.moh.gov.cy/phs, Fax: +357 22 608649. Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

5. Πώς να φυλάσσετε το Archifar

Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.

Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για το φαρμακευτικό αυτό προϊόν.

Μετά την ανασύσταση: Τα ανασυσταμένα διαλύματα για ενδοφλέβια ένεση ή έγχυση πρέπει να χρησιμοποιούνται αμέσως. Το χρονικό διάστημα μεταξύ της αρχής της ανασύστασης και του τέλους της ενδοφλέβιας ένεσης ή έγχυσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μία ώρα.

Μην καταψύχετε το ανασυσταμένο διάλυμα.

Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην εξωτερική συσκευασία μετά την {ΗΜ. ΛΗΞ}. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.

Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίματα. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

Τι περιέχει το Archifar

- Η δραστική ουσία είναι μεροπενέμη. Κάθε φιαλίδιο περιέχει 500mg ή 1g μεροπενέμη ως τριϋδρική μεροπενέμη (meropenem trihydrate).
- Το άλλο συστατικό είναι ανθρακικό νάτριο.

Εμφάνιση του Archifar και περιεχόμενα της συσκευασίας

Το Archifar είναι άσπρη μέχρι ελαφριά κίτρινη κρυσταλλική σκόνη για διάλυμα για ένεση/έγχυση.

Η σκόνη τοποθετείται σε γυάλινα φιαλίδια για 20ml και 30 ml.

Συσκευασίες με 1, 10, 25, 50 και 100 φιαλίδια είναι διαθέσιμες.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

Medochemie Ltd, Κωνσταντινουπόλεως 1-10, 3011 Λεμεσός, Κύπρος

Παρασκευαστής

Medochemie Ltd., Factory C, Μιχαήλ Ηρακλέους 2, Βιομηχανική Περιοχή Αγ. Αθανασίου, Λεμεσός, Κύπρος

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις: 06/2016

Συμβουλή/Ιατρική εκπαίδευση

Τα αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία λοιμώξεων που προκαλούνται από βακτήρια. Δεν έχουν καμία δράση σε λοιμώξεις που προκαλούνται από ιούς.

Μερικές φορές μία λοίμωξη που προκαλείται από βακτήρια δεν ανταποκρίνεται σε μια αντιβιοτική θεραπεία. Ένας από τους συνηθέστερους λόγους για να συμβεί αυτό είναι διότι τα βακτήρια που προκαλούν τη λοίμωξη είναι ανθεκτικά στο αντιβιοτικό που έχει ληφθεί. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να επιβιώσουν και ακόμα να πολλαπλασιαστούν παρά τη χρήση του αντιβιοτικού.

Τα βακτήρια μπορούν να αναπτύξουν ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά για πολλούς λόγους. Χρησιμοποιώντας τα αντιβιοτικά προσεκτικά μπορείτε να βοηθήσετε ώστε να μειωθεί η πιθανότητα να γίνουν τα βακτήρια ανθεκτικά σ' αυτά.

Όταν ο γιατρός σας συνταγογραφεί μία θεραπεία με ένα αντιβιοτικό έχει σκοπό να θεραπεύσει μόνο την τρέχουσα ασθένειά σας. Δίνοντας προσοχή στις ακόλουθες συμβουλές θα βοηθήσετε να εμποδιστεί η ανάπτυξη αντοχής των βακτηρίων που θα μπορούσαν να σταματήσουν τη δράση του αντιβιοτικού.

1. Είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνετε τα αντιβιοτικά στη σωστή δόση, τη σωστή ώρα και για το σωστό αριθμό ημερών. Διαβάστε τις οδηγίες στην επισήμανση και εάν δεν καταλαβαίνετε κάτι ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας να σας το εξηγήσει.
2. Δεν πρέπει να παίρνετε αντιβιοτικά εκτός εάν έχουν συνταγογραφηθεί ειδικά για σας και πρέπει να τα χρησιμοποιείται μόνο για τη θεραπεία της λοίμωξης για την οποία έχουν συνταγογραφηθεί.
3. Δεν πρέπει να παίρνετε αντιβιοτικά τα οποία είχαν συνταγογραφηθεί σε άλλους ανθρώπους ακόμα και εάν είχαν μία λοίμωξη παρόμοια με τη δική σας.
4. Δεν πρέπει να δίνετε αντιβιοτικά που έχουν συνταγογραφηθεί για σας σε άλλους ανθρώπους.
5. Εάν σας έχει περισσέψει αντιβιοτικό όταν έχετε ολοκληρώσει τη θεραπεία σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας πρέπει να επιστρέψετε το υπόλοιπο στο φαρμακείο για την κατάλληλη απόρριψή του.

Οι πληροφορίες που ακολουθούν απευθύνονται μόνο σε επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης:

Οδηγίες χορήγησης του Archifar στον εαυτό σας ή σε κάποιον άλλο στο σπίτι

Μερικοί ασθενείς, γονείς και άτομα που φροντίζουν τον ασθενή έχουν εκπαιδευτεί να χορηγούν το Archifar στο σπίτι.

Προσοχή – Πρέπει να χορηγείτε το Archifar μόνο στον εαυτό σας ή σε κάποιο άλλο άτομο στο σπίτι μόνο μετά από εκπαίδευση που σας έχει γίνει από γιατρό ή νοσοκόμο.

Ένεση

Η μεροπενέμη που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για ενδοφλέβια ένεση εφόδου πρέπει να ανασυσταθεί με αποστειρωμένο ύδωρ για ενέσιμα μέχρι την τελική συγκέντρωση των 50 mg/ml.

Έγχυση

Για ενδοφλέβια έγχυση τα φιαλίδια με τη μεροπενέμη μπορεί να ανασυσταθούν απευθείας με νάτριο χλωριούχο 9 mg/ml (0,9%) ή με διαλύματα γλυκόζης για έγχυση 50 mg/ml (5%) μέχρι την τελική συγκέντρωση των 1 έως 20 mg/ml.

Πώς να ετοιμάσετε αυτό το φάρμακο

- Το φάρμακο πρέπει να αναμιχθεί με κάποιο υγρό (το διαλύτη). Ο γιατρός σας θα σας πει την ποσότητα του διαλύτη που θα χρησιμοποιήσετε.
- Χρησιμοποιήστε το διάλυμα αμέσως μόλις το ετοιμάσετε. Μην καταψύχεται το διάλυμα.

Πώς να ετοιμάσετε αυτό το φάρμακο

1. Πλύνετε τα χέρια σας και στεγνώστε τα καλά. Προετοιμάστε μια καθαρή περιοχή προετοιμασίας.
2. Πάρτε ένα φιαλίδιο Archifar από τη συσκευασία. Ελέγξτε το φιαλίδιο και την ημερομηνία λήξης. Ελέγξτε εάν το φιαλίδιο είναι ανέπαφο και δεν έχει φθορές.
3. Αφαιρέστε το πώμα επισφράγισης και καθαρίστε το ελαστικό πώμα με ένα μαντηλάκι με οινόπνευμα. Αφήστε το ελαστικό πώμα να στεγνώσει.
4. Τοποθετήστε μία καινούρια αποστειρωμένη βελόνα σε μία καινούρια αποστειρωμένη σύριγγα χωρίς να αγγίξετε τα άκρα.
5. Αναρροφήστε τη συνιστώμενη ποσότητα του στείρου «Water for injection» μέσα στη σύριγγα.

Η απαιτούμενη ποσότητα υγρού φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Δόση Archifar	Ποσότητα του «Water for injection» που χρειάζεται για αραίωση
500 mg (χιλιοστά του γραμμαρίου)	10 ml (χιλιοστά του λίτρου)
1 g (γραμμάριο)	20 ml
1,5 g	30 ml
2 g	40 ml

Παρακαλείσθε να σημειώσετε: Εάν η συνταγογραφούμενη δόση του Archifar είναι μεγαλύτερη του 1 g, πρέπει να χρησιμοποιήσετε περισσότερα από 1 φιαλίδιο Archifar. Τότε μπορείτε να αναρροφήσετε το υγρό από τα δύο φιαλίδια σε μία σύριγγα.

6. Περάστε τη βελόνα της σύριγγας διαμέσου του κέντρου του ελαστικού πώματος και εγχύστε τη συνιστώμενη ποσότητα του ύδατος για ενέσιμα `Water for Injection` μέσα στο φιαλίδιο ή στα φιαλίδια του Archifar.
7. Αφαιρέστε τη βελόνα από το φιαλίδιο και ανακινήστε το φιαλίδιο καλά για 5 δευτερόλεπτα περίπου, ή μέχρι όλη η σκόνη να έχει διαλυθεί. Καθαρίστε το ελαστικό πώμα για μία φορά ακόμα με ένα καινούριο μαντηλάκι με οινόπνευμα και αφήστε το ελαστικό πώμα να στεγνώσει.
8. Σπρώξτε το έμβολο μέχρι τέλους μέσα στη σύριγγα και περάστε πάλι τη βελόνα διαμέσου του ελαστικού πώματος. Καθώς κρατάτε και τη σύριγγα και το φιαλίδιο, αναστρέψτε το φιαλίδιο.
9. Βεβαιωθείτε ότι η άκρη της βελόνας παραμένει μέσα στο υγρό και τότε τραβήξτε προς τα πίσω το έμβολο. Αναρροφήστε όλο το υγρό από το φιαλίδιο μέσα στη σύριγγα.
10. Αφαιρέστε τη βελόνα και τη σύριγγα από το φιαλίδιο και απορρίψτε το άδειο φιαλίδιο σε ένα ασφαλές μέρος.
11. Κρατήστε τη σύριγγα όρθια, με τη βελόνα να δείχνει προς τα πάνω. Χτυπήστε ελαφρά τη σύριγγα έτσι ώστε οι φυσαλίδες στο υγρό να μετακινηθούν προς το πάνω μέρος της σύριγγας.
12. Αφαιρέστε τον αέρα από τη σύριγγα σπρώχνοντας ελαφρά το έμβολο μέχρι να φύγει ο αέρας.
13. Εάν χρησιμοποιείτε το Archifar στο σπίτι, απορρίψτε οποιεσδήποτε βελόνες και τα εξαρτήματα της έγχυσης που έχετε χρησιμοποιήσει με τον κατάλληλο τρόπο. Εάν ο γιατρός σας αποφασίσει να διακόψει τη θεραπεία σας, απορρίψτε κάθε αχρησιμοποίητο Archifar με τον ενδεδειγμένο τρόπο.

Χορηγώντας την ένεση

Το φάρμακο αυτό μπορεί να χορηγηθεί είτε μέσω μίας μικρής κάνουλας ή ενός φλεβικού καθετήρα ή μέσω εισόδου ή κεντρικής γραμμής.

Χορηγώντας το Archifar μέσω μίας μικρής κάνουλας ή ενός φλεβικού καθετήρα

1. Αφαιρέστε τη βελόνα από τη σύριγγα και απορρίψτε προσεκτικά τη βελόνα στο δοχείο σας με τα αιχμηρά αντικείμενα.
2. Σκουπίστε την άκρη της μικρής κάνουλας ή του φλεβικού καθετήρα με ένα μαντηλάκι με οινόπνευμα και αφήστε τη να στεγνώσει. Ανοίξτε το καπάκι της κάνουλας και συνδέστε τη σύριγγα.
3. Σπρώξτε αργά το έμβολο της σύριγγας ώστε να χορηγείτε το αντιβιοτικό σταθερά για περίπου 5 λεπτά.
4. Όταν τελειώσετε τη χορήγηση του αντιβιοτικού και η σύριγγα είναι άδεια, βγάλτε τη σύριγγα και ξεπλύνετε την κάνουλα όπως σας συνέστησε ο γιατρός ή ο νοσοκόμος σας.
5. Κλείστε το καπάκι της κάνουλας και προσεκτικά απορρίψτε τη σύριγγα στο δοχείο σας με τα αιχμηρά αντικείμενα.

Χορηγώντας το Archifar μέσω μιας εισόδου ή κεντρικής γραμμής

1. Αφαιρέστε το καπάκι της εισόδου ή της γραμμής, καθαρίστε το τέλος της γραμμής με ένα μαντηλάκι με οινόπνευμα και αφήστε το να στεγνώσει.
2. Συνδέστε τη σύριγγα και σπρώξτε αργά το έμβολο στη σύριγγα ώστε να χορηγείτε το αντιβιοτικό σταθερά για περίπου 5 λεπτά.
3. Όταν τελειώσετε τη χορήγηση του αντιβιοτικού και η σύριγγα είναι άδεια, βγάλτε τη σύριγγα και ξεπλύνετε τη γραμμή όπως σας συνέστησε ο γιατρός ή ο νοσοκόμος σας.
4. Τοποθετήστε ένα καινούριο καθαρό καπάκι στη κεντρική σας γραμμή και προσεκτικά απορρίψτε τη σύριγγα στο δοχείο σας με τα αιχμηρά αντικείμενα.